

## Antykoncepcja

Czy aktualnie stosuje lub przyjmuje Pani środki antykoncepcyjne?

Tak  Nie

Jeśli Tak, należy tutaj wpisać ich nazwy:

.....

.....

Niniejszą kartę należy wziąć na następną wizytę u swojego lekarza lub lekarza ginekologa, który będzie w stanie doradzić, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych lub alternatywnych metod antykoncepcji.

## Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla pacjentów przyjmujących **BOSENTAN RANBAXY (Bosentanum)**

Niniejsza karta zawiera ważne informacje o leku Bosentan Ranbaxy.  
Prosimy uważnie się z nią zapoznać przed rozpoczęciem leczenia lekiem Bosentan Ranbaxy.

Imię i nazwisko pacjenta: .....

Lekarz przepisujący: .....

W przypadku pytań dotyczących leku Bosentan Ranbaxy należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

## Niniejszą stronę powinny uważnie przeczytać kobiety w wieku rozrodczym

Bosentan Ranbaxy może negatywnie wpłynąć na rozwój płodu. Z tego względu, nie wolno stosować leku Bosentan Ranbaxy jeśli pacjentka jest w ciąży oraz w trakcie leczenia lekiem Bosentan Ranbaxy nie wolno zachodzić w ciążę. Ponadto u pacjentki z tętnicznym nadciśnieniem płucnym ciąża może spowodować znaczne nasilenie objawów choroby. W przypadku podejrzenia zajścia w ciążę należy powiadomić o tym swojego lekarza lub lekarza ginekologa.

### Antykoncepcja

Hormonalna kontrola urodzin – np. doustne środki antykoncepcyjne lub tabletki antykoncepcyjne, wstrzyknięcia hormonalne, implanty lub antykoncepcyjne plastry skórne – nie zapewnia skutecznej ochrony przed ciążą u kobiet stosujących lek Bosentan Ranbaxy. Należy stosować barierową metodę kontroli urodzin - taką jak prezerwatywa, wkładka wewnątrzmaciczna lub gąbka dopochwowa - poza metodami hormonalnej kontroli urodzin. Należy omówić wszelkie wyłaniające się pytania ze swoim lekarzem lub lekarzem ginekologiem – wypełnić informacje po drugiej stronie tej karty i przekazać swojemu lekarzowi lub lekarzowi ginekologowi na następnej wizycie. Należy wykonać test ciążowy przed rozpoczęciem leczenia preparatem Bosentan Ranbaxy, a następnie co miesiąc w okresie leczenia, nawet jeśli pacjentka uważa, że nie jest w ciąży.

Data pierwszego comiesięcznego testu ciążowego: .....

## Badanie krwi dla określenia czynności wątroby

U niektórych pacjentów przyjmujących lek Bosentan Ranbaxy stwierdzono nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby. W czasie leczenia lekiem Bosentan Ranbaxy lekarz zleci regularne badania krwi w celu kontrolowania zmian czynności wątroby.

**Należy pamiętać o comiesięcznych badaniach krwi dla określenia czynności wątroby.**

**Po zwiększeniu dawki należy wykonać dodatkowe badanie po 2 tygodniach.**

Data pierwszego comiesięcznego badania: .....

Plan comiesięcznych badań krwi dla określenia czynności wątroby:

Sty .....	Kwi .....	Lip .....	Paź .....
Lut .....	Maj .....	Sie .....	Lis .....
Mar .....	Cze .....	Wrz .....	Gru .....

