

# KARTA OSTRZEGAWCZA DLA PACJENTA

## Wasedoc

dabigatran eteksylan

- Należy mieć kartę zawsze przy sobie/opiekun powinien mieć kartę zawsze przy sobie
- Należy upewnić się, że jest to ostatnia wersja

Marzec 2022, Wersja 1

### **Drogi Pacjencie/Opiekunie pacjenta pediatrycznego,**

Lekarz Państwa/Państwa dziecka zalecił stosowanie leku Wasedoc (dabigatran eteksylan). Aby bezpiecznie stosować lek Wasedoc, proszę zapoznać się z istotnymi informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania. Ponieważ niniejsza karta ostrzegawcza dla pacjenta zawiera ważne informacje na temat leczenia Państwa/Państwa dziecka, zalecane jest aby posiadać ją zawsze przy sobie i informować pracowników służby zdrowia, że przyjmuje Pan/Pani lub Państwa dziecko lek Wasedoc.

### **Wasedoc - Informacje dla pacjenta/Opiekuna pacjenta pediatrycznego**

Leczenie Państwa/Państwa dziecka

- Lek Wasedoc rozrzedza krew. Jest stosowany w leczeniu istniejących zakrzepów krwi lub zapobieganiu tworzenia się niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Podczas stosowania leku Wasedoc należy przestrzegać zaleceń lekarza swojego/swojego dziecka. Nigdy nie należy pomijać dawki ani przerywać przyjmowania leku Wasedoc bez konsultacji ze swoim lekarzem/lekarzem swojego dziecka.
- Należy poinformować swojego lekarza/lekarza swojego dziecka o wszystkich przyjmowanych lekach.
- Należy poinformować swojego lekarza/lekarza swojego dziecka o przyjmowaniu leku Wasedoc przed jakąkolwiek operacją/zabiegiem inwazyjnym.
- Lek Wasedoc można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Kapsułek nie wolno kruszyć, żuć ani opróżniać zawartości kapsułki.

Kiedy należy skonsultować się z lekarzem

- Przyjmowanie leku Wasedoc może zwiększyć ryzyko krwawienia. Należy natychmiast porozmawiać ze swoim lekarzem/lekarzem swojego dziecka, jeśli wystąpią objawy krwawienia, takie jak: obrzęk, dyskomfort, nietypowy ból lub ból głowy, zawroty głowy, bladość, osłabienie, nietypowe siniaki, krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł, nietypowo długie krwawiące skaleczenia, nieprawidłowe krwawienie miesięczkowe lub krwawienie z pochwy, krew w moczu, która może być różowa lub brązowa, stolce czerwono/czarne, odkrztuszanie krwi, wymioty krwią lub treścią przypominającą fusy z kawy.
- W przypadku upadku lub urazu, zwłaszcza uderzenia w głowę, należy pilnie skontaktować się ze swoim lekarzem/lekarzem swojego dziecka.
- Nie należy przerywać przyjmowania leku Wasedoc bez konsultacji ze swoim lekarzem/lekarzem swojego dziecka, jeśli wystąpią zgaga, nudności, wymioty, dyskomfort w żołądku, wzdęcia lub ból w górnej części brzucha.

## Wasedoc – informacje dla pracowników opieki zdrowotnej

- Wasedoc to doustny antykoagulant (bezpośredni inhibitor trombiny).
- W przypadku zabiegów chirurgicznych lub innych procedur inwazyjnych może być konieczne odstawienie leku Wasedoc.
- W przypadku wystąpienia poważnych krwawień należy natychmiast przerwać stosowanie leku Wasedoc.
- Dla dorosłych pacjentów dostępny jest specyficzny środek odwracający działanie (idarucyzumab). Skuteczność i bezpieczeństwo swoistego środka odwracającego działanie idarucyzumabu u dzieci nie zostało ustalone. Aby uzyskać szczegółowe informacje i dodatkowe porady dotyczące przeciwdziałania działaniu przeciwzakrzepowemu produktu Wasedoc, należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego Wasedoc i idarucyzumabu.
- Lek Wasedoc jest wydalany głównie przez nerki; należy utrzymać odpowiednią diurezę. Lek Wasedoc jest dializowalny.

**Proszę o wypełnienie tej sekcji lub poproszenie o to swojego lekarza/lekarza swojego dziecka.**

### Informacje o pacjencie

---

Imię i nazwisko pacjenta

---

Data urodzenia

---

Wskazanie do leczenia przeciwzakrzepowego

---

Dawka leku Wasedoc